HÃY UỐNG

THUỐC

THƯƠNG

XUYÊN

ĐỂ TRÁNH

BÊNH

HO LAO

THUỐC

ΒÍ

QUYÊT

NGUA

LAO

PROTECT YOURSELF FROM TB

TAKE
YOUR PILLS
REGULARLY!


PILLS TO PREVENT TB

CHO BẠN VÀ GIA ĐỈNH

FOR YOU AND YOUR FAMILY


Bí quyết để ngừa lao là dùng những viên thuốc này

The secret of preventing TB is pills!



- 1. Vì Vậy, Bắc Sĩ kế toa những thuốc này Đế NGỦA LAO: cho ban.
- 2. Những thuốc này có thể là loại Isoniazid (thường được gọi là INH). Nó cũng loại thuốc mà các BỆNH NHÂN BỊ LAO dùng để trị bệnh. Đối với hạn, thuốc này sẽ có hiệu lực ngữa bệnh.
- 3. Mumg-Điểu này rất quan trọng-Nấu muốn thuốc có hiệu lực giúp hạn ngừa bệnh, bạn phải dùng thường xuyên theo đúng lời Y Si.

- 1. That's why the doctor has prescribed them for you: to protect you from TB.
- Your pills are probably isoniazid (often called INH). It is the same kind of medicine that many TB patients take to help them get over the disease. For you, it will help prevent disease.
- But-and this is important-if they are to help you, the pills must be taken regularly: as often and as long as the doctor says.





- Đôi khi một vài người ở quanh bạn mắc bệnh lao. Như vậy có thể trong người bạn có vi trung lao-tuy bạn không bị bệnh, nhưng trong trường hợp này bạn nên để phòng trước là hơn.
- 2. Nếu kết quả thí nghiệm phần ứng ngoài da cho biết trong người bạn có vi trùng lao, có thể Bác Sĩ nghi là bạn sẽ đặc biệt cần uống thuốc ngừa vì:
- 3. Thí nghiệm cho biết bạn bị nhiễm trùng lao mới dây.
- 4. Trước đã từng bị lao và có thể chưa trị tuyệt căn với các thứ thuốc hiện đại.
- 5. Phim phối có dấu khác thường cần dược phòng ngữa.
- 6. Nhiều người trong cơ thể có vi trùng lao ở trong trạng thái thụ dông-không phải hay chứa phải là họ bị bệnh lao, tuy nhiên ưông thuốc ngừa sẽ chắc chắn bảo vệ sức khỏe cho họ.



- 1. Someone close to you may have TB. That raises the possibility you have TB germs in your body-even though you are not sick. If so, you need protection.
- If you have TB germs in your body, as shown by a tuberculin skin test, the doctor may feel that you particularly need preventive pills because....
- Your tests show that you got the germs quite recently.
- You had TB once and maybe were not treated completely with the medicines we have today.
- Something on your chest X-ray makes preventive pills a good idea.
- 6. Many people have TB germs in their bodies in a resting state. These people are not sick with TB. Taking preventive pills will make sure they stay well.

- Thuốc ngừa (Isoniazid) hoàn toàn vô hại theo như hàng triệu người đã dùng cho biết. Nhưng dòi khi nó cũng gây ra trạng thái khó chịu.
- 2. Đôi khi dùng thuốc bị phần ung là do gan. Khối đầu bạn ăn không thấy ngọn miệng, ói mửa, suy-yệu, nước tiểu vàng đậm (như trà hoặc cà-phê đen đậm) và da vàng hoặc mắt vàng.
- 3. Nếu thấy những phần ứng như trên xây ra, hãy, ngừng ngay thuộc và báo cho Y-Tá vệnh viện về bắt cử sự khác lạ nào bạn cầm thấy khi uống thuộc.



- The TB preventive pills (Isoniazid) are remarkably safe, as millions of people taking them have found. But once in a while they cause upset.
- 2. One side effect that happens sometimes is a possible liver reaction. It may start with loss of appetite, nausea and weakness and go on-within about a week-with color (like dark tea or coffee) in the urine and then yellow color in your skin or eyeballs.
- 3. If anything like that happens, stop taking the pills and be sure to tell your doctor or clinic nurse. In fact, tell them about any illness you feel while pill-taking.



- 1. Có thể Bác Sĩ nói với bạn là con hạn cần ướng thuốc ngừa lao.
- 2. Mặc dù con bạn không hị bệnh nhưng việc ngưa lao rất cần thiết. Tuy nhiên con bạn vẫn có cuộc sống bình thường.
- 3. Không nên giữ riêng trẻ con dang nông thuộc ngừa lao. Phải để chúng nó chơi chung với những trẻ khác. Phải để chúng nó di học như thường nên chúng đến tuổi đi học.
- 4. Nhưng vì con bạn không cắm thấy đau vều, nên nó khó lòng nhớ việc uống thuốc mỗi ngày và có thể phải uống như vậy cắ năm. Và bắt buộc phải uống hàng ngày, nếu không thuốc sẽ không hiểu nghiêm.
- 5. Điều này cũng được áp dụng cho cả Ban!




- 1. The doctor may have told you your child needs the pills to prevent TB.
- Even if your child is not sick the preventive treatment may be needed. But your child can and should lead a normal life.
- 3. Children taking TB preventive pills should not be kept apart. Let them play with others. Let them go to school if they are school age.
- 4. Because your child feels fine, it may be hard to remember the medicine every dayperhaps for a whole year. But it must be every day, or it may not work.
- 5. That applies to you too!



- Có nhiều cách để nhắc ta nhớ ướng thuốc. Bạn sẽ tìm ra một phương thức tốt riêng cho mình nêu muốn, Sau day là một vài để nghị:
- 2. Dùng thuốc hàng ngày cho thất đúng giờ.
- 3. Ghi lên tấm lịch mỗi lần bạn dùng thuốc. Bạn có thể xin những cuốn lịch thuốc đặc biệt này tại bệnh viện hoặc các Bác Sĩ. Có nơi có những loại lịch có gắn thuốc liền vào đó.
- 4. Mối tối, trước khi đi ngũ, dễ sắn thuốc ra cho ngày hòm sau.
- 5. Dễ thuốc nơi não bạn bắt buộc phải ngô tới, như phòng tắm hoặc nhà hép chẳng hạn. Nhưng phải dễ nơi nào mà trẻ con không với tới dược.

- 1. There are lots of ways to remember your pills. You will want to work out your own best system, but here are a few suggestions:
- Take the medicine at the same time every day.
- 3. Mark off on a calendar every time you take your pills. You might ask the clinic or your doctor about special pill calendars. Some places have themwith the pills fastened right onto the calendar.
- Each night, put out the pills for the next day.
- 5. Keep the pills in a place where you can't miss them maybe in the bathroom or the kitchen. But be sure they are out of the reach of children.







PROTECT YOURSELF FROM TB

TAKE YOUR PILLS REGULARLY!

